

ULTIMAS NOTICIAS

www.virbac.es

NOTICIAS EN LEISHMANIOSIS / EDICIÓN ESPAÑOLA

2,5 millones de perros en Europa infectados con el parásito leishmania

Insectos tipo “mosquito” transmiten a los perros esta enfermedad potencialmente mortal



La leishmaniosis canina está causada por un parásito microscópico, la leishmania, que se transmite a los perros por la picadura de un insecto (el flebotomo o “mosca de la arena”) a menudo mal llamado “mosquito”. Este insecto está muy extendido y se encuentra habitualmente en diversos hábitats del sur de Europa.

Los síntomas, que no siempre aparecen de forma inmediata, incluyen fiebre, caída del pelo (especialmente alrededor de los ojos), pérdida de peso, úlceras en la piel y crecimiento anormal de las uñas. Los órganos internos también se ven afectados, lo que puede resultar en anemia, artritis e insuficiencia renal grave. La leishmaniosis canina puede provocar la muerte;

el tratamiento ayuda a controlar los síntomas, pero no puede curar la enfermedad. Dado que la infección se transmite por la picadura de un insecto, para prevenirla se suelen utilizar sprays, pipetas o collares repelentes. Pero a pesar de ello la leishmaniosis canina sigue siendo una grave amenaza en España. ¡Ahora hay una vacuna disponible!

Reduce el riesgo. Vacuna a tu perro.

Pregunta a tu veterinario sobre la vacunación contra la leishmaniosis canina

La salud animal es nuestra pasión

